

Principales especies de moscas



Muscina stabulans




Musca domestica



Fannia canicularis

	<i>Muscina stabulans</i>	<i>Musca domestica</i>	<i>Fannia canicularis</i>
Nombre común	Mosca doméstica mayor	Mosca doméstica	Mosca doméstica menor
Tamaño (mm)	8-10	5-8	4-6
Hábitat larvario	Larvas depredadoras	Excrementos sólidos	Excrementos líquidos
Comportamiento	Propias de establos	Se posan sobre los alimentos	Vuelan en círculos

Anticimex the moden pest control company.
Mediante la prevención, la nueva tecnología y las soluciones sostenibles, satisfacemos las nuevas demandas de entornos libres de plagas, sanos y seguros, en 20 países alrededor del mundo. Anticimex España cuenta con una plantilla de 700 personas en todo el territorio nacional (islas incluidas), para ofrecer servicios de control de plagas, higiene ambiental y desinfección a más de 30.000 clientes a través de sus 21 delegaciones propias.




 **Anticimex®**

900 828 008

www.anticimex.es/moscas

 **Anticimex®**



Control Integral
de Moscas


Cómo evitar que las moscas críen

Estas especies de moscas crían principalmente en **excrementos**, por lo que suelen estar muy asociadas a animales, tanto de ganadería como de compañía. Recoge y gestiona correctamente los excrementos.





Las moscas también pueden criar en alimentos en estado de putrefacción, por lo que tendremos que retirar la **basura** de nuestras viviendas con asiduidad.

Los **contenedores de basura** pueden retener materia orgánica en la cual las larvas de moscas se pueden desarrollar. Han de estar limpios y cerrados.




Cómo evitar que las moscas entren dentro de nuestras casas

Mantén puertas y ventanas cerradas



Coloca redes o telas mosquiteras en las ventanas

Instala Insectocaptores con luz led ultravioleta



Ciclo de vida de las moscas

Las moscas adultas se alimentan de líquidos azucarados. Las hembras depositan los huevos directamente sobre excrementos o materia orgánica en descomposición.

Al día siguiente, eclosionan las larvas, las cuales tienen una coloración blanquecina.

Durante 4 ó 7 días se dedican a alimentarse y a aumentar de tamaño en 3 fases larvarias. Realizan túneles por el interior de su alimento. Cuando alcanzan su tamaño máximo, se desplazan a la superficie para convertirse en pupa y realizar la metamorfosis.

Tras 4 días, de la pupa emerge el adulto, completando así el ciclo.

